



TRAITEMENTS DU SYNDROME METABOLIQUE, DU CUSHING, DE L'HIRSUTISME OU DE LA GALACTORRHÉE DANS L'ESPECE EQUINE

A) CUSHING / HIRSUTISME / GALACTORRHÉE

- **PERGOLIDE – PRASCENDND** (BOEHRINGER INGELHEIM) :

Si possible en fin de journée 1 mg /j pour un cheval de moins de 500 kg (éventuellement à doubler en cas d'inefficacité du traitement au bout d'un mois)

- **Mesures hygiéniques et diététiques** : elles sont extrêmement importantes pour le confort et la survie de l'animal :

- Entretien des dents et des pieds
- Administration régulière de compléments nutritionnels riches en vitamines et en oligoéléments.
- Privilégier les pâtures (ou le foin) à condition qu'elles ne soient pas trop riches.

B) GALACTORRHÉE

- **PERGOLIDE - PRASCEND** (cf ci-dessus)

- **Mesures diététiques** : limiter (autant que possible) l'apport énergétique

C) SYNDROME METABOLIQUE

- **METFORMINE : GLUCOPHAGEND** et nombreux génériques

Indication : équidé encore jeune = obèse et insulino-résistant

comprimés de 500, 850 ou 1 000 mg (~ 3 à 15 € TTC les boîtes de 30 à 90 comprimés)

1,5 g / 100 kg (*La dose peut être doublée en cas de résultats insuffisants, le traitement doit être effectué sur une longue période*)

- **Mesures hygiéniques et diététiques indispensables** : il est nécessaire de faire maigrir l'animal lentement mais régulièrement sur le long terme.

En fonction des contraintes de terrain, il faut privilégier les pâtures (ou le foin) à condition qu'elles ne soient pas trop riches.

CONTRÔLES DE TRAITEMENT

- Ne doser en priorité que les hormones augmentées au diagnostic
- Idéalement, une prise de sang 3 à 5 h après la prise du médicament